

MIJN BEDRIJFSMETHODE

HET HELE JAAR DOOR

JANUARI

- Nieuwjaarscadeau



FEBRUARI

- Rust



MAART

- Snel kijken en wegen



MAART APRIL

- BIJ TE WEINIG
GEWICHT
SUIKERDEEG GEVEN



APRIL

- Bij goed weer (+15°C):
eerste nazicht



APRIL

- Honing zolder zetten:
- Bij sterk volk en eerste (fruit)bomen in bloei en Goede weersvooruitzichten



APRIL

- Koninginnen rooster plaatsen



APRIL



APRIL


- Extra plaats geven en darrenraat plaatsen



Het werkster&darrenraam, bovenaan voor werksterraat, onderaan darrenraat.

APRIL

- Waar darreraad plaatsen?



MEI

- Controle op koninginnen doppen
- Plaats geven indien nodig



MEI

- Doppen breken
- Darrenraat snijden



MEI

- Doppen breken om de 10 dagen herhalen



MEI

- Plaats geven in de honingzolder



EIND MEI

- Honig slingeren voor acacia in bloem komt



JUNI

- Plaats geven of aflegger maken
- Blijven controleren op doppen

Brut

Brut

Anfangsstreifen

Futter/Pollen

JUNI

- Plaats geven
- Volk controleren om de 10 dagen
- Afleggers controleren op doppen en/of nieuwe koningin geven
- Bij slecht weer aflegger eten geven





JUNI

- Andere mogelijkheid om de voederen

arsten Lorenzen

JULI

- Laatste keer slingeren na uitbloeien van de tamme kastanje



JULI

- Alle broed wegnemen
- (niet verwarren met stuifmeel)



JULI

- Nieuw volk op waswafels plaatsen met eventueel raam stuifmeel en voedsel



JULI

- Binnen 7 dagen na wegnemen van broed:

Kasten behandelen met oxaalzuur of mierenzuur of andere erkende producten



JULI

- Mierenzuur




JULI

- Direct na het afhalen van de honing de kasten voederen
- Tegen eind juli zeker 5 liter per kast geven verspreid over 2 keer




AUGUSTUS

- Kort nazicht: 1 raam uithalen en kijken of er nog broed aanwezig is
- 2 à 3 liter eten geven
- Bij slecht weer: 4 à 5 liter geven



BEGIN SEPTEMBER

- Nazicht en eventueel koninginnen wisselen
- Nog 2 liter voederen
- Vliegopening verkleinen bij kleine volken



EIND SEPTEMBER

- 2 tot 6 liter voedsel geven
in 2 keer geven als de
voederbak te klein is



OKTOBER

- Nazicht aan vluchtgat



NOVEMBER

- Rust



NOVEMBER

- Rust



atie waswafels gieten.

DECEMBER

- Rust




BEDRIJF 'S METHODE MET SIMPLEX



MAART

- Toestand begin Maart




BEGIN MAART

- Op een broedbak brengen




MAART APRIL

- Tweede broedbak toeveogen




APRIL

- Honingzolder toevoegen



MEI

- Plaats geven door vul blokken weg te nemen of honingzolder bij te plaatsen



EIND MEI BEGIN JUNI

- Plaats geven of aflegger maken
- Blijven controleren op doppen

Brut


Brut

Anfangsstreifen

Futter/Pollen

EIND JUNI

- Koninginnen rooster verplaatsen



JULI

- Honing afnemen
- Broed wegnemen
- Nieuw volk op waswafels plaatsen met eventueel raam stuifmeel en voedsel




BIJEN ZIEKTES

- Volgende ziektes moeten verplicht aangegeven worden:
- Acariose
- Amerikaans vuilbroed
- Europees vuilbroed
- Kleine bijenkastkever (*Aethina tumida*)
- Tropilaelapsmijt (*Tropilaelaps* spp.)
- varrao

ACARIOSE

- Mijt die in luchtbus kruit



AMERIKAANS VUILBROED

- Broedziekte



EUROPEES VUILBROED

- Broedsiekte



KLEINE BIJENKASTKEVER



KLEINE BIJENKASTKEVER



TROPILAEAPSMIJT (TROPILAEELAPS SPP.)



Tropilaelaps clarae kan geen bloed opzuigen bij de volwassen bij: daarvoor zijn haar monddelen te zwak. - Foto Diana Sammatoro.

VARROAMIJT



VARROAMIJT



VARROASE



ROER

- Vaak veroorzaakt door nozema

